

Продукт для щоденого підтримання здоров'я нижніх сечовивідних шляхів котів

щоденний ДОГЛЯД



Feluro®

Всього 4 інгредієнти для підтримання здоров'я нижніх сечовивідних шляхів

Shaping the future of animal health

Virbac




ЧОМУ ВАЖЛИВО СЛІДКУВАТИ ЗА

ЗДОРОВ'ЯМ НИЖНІХ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ?

2/3

КОТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НИЖНІХ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ МОЖУТЬ МАТИ РЕЦИДИВ[4]

- Рецидиви особливо часті у кішок з котячим ідіопатичним циститом
- Рецидиви можуть виникати більше 3 разів на рік



ОСНОВНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я НИЖНІХ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ


- ЗБІЛЬШЕННЯ СПОЖИВАННЯ ВОДИ
- КОНТРОЛЬ ЧАСТОТИ СЕЧОВИДІЛЕННЯ
- КОНТРОЛЬ РН СЕЧІ
- ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СЕЧОВОГО МІХУРА
- ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ'Я КЛІТИН СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
- ЗМЕНШЕННЯ СТРЕСОВИХ ВПЛИВІВ
- СПРИЯННЯ СТЕРИЛЬНОСТІ СЕЧІ

Нижні сечовивідні шляхи котів можуть бути уражені різними способами

~8%

котів страждають від захворювань нижніх сечовивідних шляхів

Основні причини захворювання у котів[1-4]



- ~50-60 % — Котячий ідіопатичний цистит
- ~20-30 % — Сечокам'яна хвороба або уретральні камені
- ~10-15 % — Бактеріальний цистит

1. Lekcharoensuk C. *et al*. Epidemiologic study of risk factors for lower urinary tract diseases in cats. J. Am. Vet. Med. Assoc. 218:1429 (2001)
2. Sævik BK. *et al*. Causes of lower urinary tract disease in Norwegian cats. J. Feline Med. Surg. 13: 410 (2011)
3. Piyarungsri K. *et al*. Prevalence and risk factors of feline lower urinary tract disease in Chiang Mai, Thailand. Sci. Rep. 10:196 (2020)
4. Kaul E *et al*. Recurrence rate and long-term course of cats with feline lower urinary tract disease. J. Feline Med. Surg. 22:544 (2020)
5. Buffington CAT. Idiopathic cystitis in domestic cats--beyond the lower urinary tract. J. Vet. Intern. Med. 25:784 (2011).



Feluro®

простий у застосуванні розчин, який допомагає підтримувати здоров'я нижніх сечовивідних шляхів

ВИГОТОВЛЕНО З НАТУРАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ, що ідеально підходять для довготривалого застосування

УНІКАЛЬНА СУМІШ НАТУРАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ

ГІБІСКУС



допомагає підтримувати стерильність сечовивідних шляхів[6,7] і має антиоксидантну дію[8]

N-АЦЕТИЛ-D-ГЛЮКОЗАМІН



компонент глікозаміногліканів (ГАГ) у слизовій оболонці сечовивідних шляхів, допомагає відновлювати рівні ГАГ[9]

КОНЦЕНТРАТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ



багатий на L-теанін, який допомагає котам розслабитися[10]

FELURO® ДОБРЕ СПОЖИВАЄТЬСЯ ТА ПЕРЕНОСИТЬСЯ КОТАМИ[11]

ПЕРЕНОСИМІСТЬ[11]

ВИСОКА ПЕРЕНОСИМІСТЬ

Протестовано протягом 28 днів на 20 котах

- без продукту (4 контрольні тварини)
- 1х рекомендованої дози (8 тварин)
- 5х рекомендованої дози (8 тварин)

Не спостерігалося жодних клінічних ознак, пов'язаних із продуктом

Ніякого впливу на масу тіла, споживання їжі, гематологічні або біохімічні показники крові

СМАКОВІ ЯКОСТІ[11]

ГАРНІ СМАКОВІ ЯКОСТІ

92% котів споживали корм із додаванням Feluro®

8/10 Оцінка прийнятності, надана власниками (медіана)

- Протестовано на 89 котах протягом 7 днів
- Порівнювалось споживання корму із додаванням Feluro® із щоденним звичайним споживанням




СУЧАСНИЙ ТА НАТУРАЛЬНИЙ ПРОДУКТ

ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ'Я НИЖНІХ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ КОТІВ

Feluro®

1. ПІДТРИМУЄ НОРМАЛЬНИЙ СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
2. ПІДТРИМУЄ ЗДОРОВ'Я КЛІТИН СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У РАЗІ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ
3. ДОПОМАГАЄ ПІДТРИМУВАТИ СТЕРИЛЬНІСТЬ СЕЧІ В СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХАХ
4. ДОПОМОГАЄ ЗМЕНШИТИ СТРЕСОВІ РЕАКЦІЇ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗОВНІШНІМИ ПОДІЯМИ



ЛЕГКО ЗАСТОСОВУВАТИ



ECO FRIENDLY box — 100% recyclable box — Vegetable based ink



- **ДОЗУВАННЯ:** 1 мл двічі на день (зранку, ввечері)
- **ГАРНІ СМАКОВІ ЯКОСТІ ТА ПЕРЕНОСИМІСТЬ** завдяки натуральній оливковій олії та олії копри



ЗМІШУВАТИ ІЗ КОРМОМ АБО ТІЛЬКИ САМ ПРОДУКТ

6. Fraile B *et al*. Xyloglucan, hibiscus and propolis for the prevention of urinary tract infections: results of in vitro studies. Future Microbiol. 12:721 (2017)
7. Chou ST *et al*. Exploring the effect and mechanism of Hibiscus sabdariffa on urinary tract infection and experimental renal in ammation. J Ethnopharmacoll. 194:617 (2016)
8. Da-Costa-Rocha I. *et al*. Hibiscus sabdariffa L. - a phytochemical and pharmacological review. Food Chem. 165:424 (2014)
9. Panchaphanpong J *et al*. Effects of oral administration of N-acetyl-d-glucosamine on plasma and urine concentrations of glycosaminoglycans in cats with idiopathic cystitis. Am. J. Vet. Res. 72:843 (2011)
10. Dramard V. *et al*. Effect of l-theanine tablets in reducing stress-related emotional signs in cats: an open-label eld study. Ir. Vet. J. 71: 21 (2018)
11. Nicolas CS *et al*. Palatability and tolerance of an oral suspension developed to maintain a healthy urinary tract in cats. ECVIM online congress - Sept 2020.