

Характеристика на продукта: DOPHACYL SB 1000 mg/g

1. Идентификация на продукта

Характеристика	Детайли
Търговско Име	DOPHACYL SB 1000 mg/g
Фармацевтична Форма	Прах за приложение в питейна вода/мляко (за перорална употреба). Бял или почти бял кристален прах.
Активно Вещество	Натриев салицилат
Концентрация	1000 mg/g (еквивалентен на 863 mg салицилова киселина на грам)
Производител	Dopharma Research B.V.
Фармакотерапевтична Група	Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) – QN02BA04 Натриев салицилат.

2. Видове животни и показания за употреба

Продуктът е предназначен за **говеда (телета)** и **прасета**.

Вид Животно	Показания
Телета (на възраст над 2 седмици)	Спомагателно лечение на висока температура (пирексия) при остри респираторни заболявания, в комбинация с подходяща (напр. антиинфекциозна) терапия, ако е необходимо.
Прасета (на възраст над 4 седмици)	Лечение на симптоми на възпаление и подпомагане на нормалното дишане при респираторни инфекции, в комбинация с подходяща антибиотична терапия, ако е необходимо.

3. Дозировка и приложение

Продуктът се прилага перорално чрез разтваряне в питейната вода или заместител на мляко (за телета).

Вид Животно	Дозировка	Продължителност на лечението
Телета	40 mg натриев салицилат на kg телесна маса, веднъж дневно.	1 до 3 дни.
Прасета	35 mg натриев салицилат на kg телесна маса, веднъж дневно.	3 до 5 дни.

4. Карентни срокове (Време на изчакване)

- **Говеда (телета):**
 - Месо и вътрешни органи: **0 дни**.
 - Не е разрешен за употреба при животни, произвеждащи мляко за консумация от човека.
- **Прасета:**
 - Месо и вътрешни органи: **0 дни**.

5. Противопоказания и специални предупреждения

- **Не се използва** в случаи на свръхчувствителност към активното вещество.
- **Не се използва** при тежки чернодробни и бъбречни нарушения, или тежка хипопротеинемия (ниско ниво на протеини в кръвта).
- **Не се използва** при стомашно-чревни язви и хронични стомашно-чревни нарушения.
- **Не се използва** при нарушения на кръвотворната система, коагулопатии (нарушения на кръвосъсирването) и хеморагична диатеза.
- **Възрастови ограничения:** Не се използва при новородени телета или телета под **2 седмици** и прасета под **4 седмици** възраст.

- **Бременност и лактация:** Не се използва по време на бременност и лактация, тъй като салициловата киселина преминава през плацентата и се излъчва в млякото.