

Кратка характеристика на продукта: DOPHEXINE 20 mg/ml

1. Идентификация на продукта

Характеристика	Детайли
Търговско Име	Dophexine 20 mg/ml
Фармацевтична Форма	Инжекционен разтвор (За парентерално приложение)
Активно Вещество	Амоксицилин (като Амоксицилин трихидрат)
Концентрация	200 mg/ml (20%)
Производител	Dopharma Research B.V.
Фармакотерапевтична Група	Антибактериални средства. Пеницилини с широк спектър – QJ01CA04 (Амоксицилин)
Специфика	Това е суспензия с удължено (дългодействащо) действие, предназначена за продължителна антибиотична концентрация.

2. Видове животни и показания за употреба

Продуктът е предназначен за **говеда, овце, прасета, кучета и котки**.

Използва се за лечение на инфекции, причинени от бактерии, чувствителни към Амоксицилин.

Системи, подлежащи на лечение	Примери за състояния
Респираторна система	Пневмонии, бронхити.
Стомашно-чревна система	Ентерити.

Системи, подлежащи на лечение	Примери за състояния
Урогенитална система	Метрити, цистити.
Кожа и меки тъкани	Рани, абсцеси, артрити.
Предоперативна профилактика	Предотвратяване на следоперативни инфекции.

3. Начин на приложение и дозировка

- **Начин на приложение:** Само **Интрамускулно (IM)** или **Подкожно (SC/SQ)**.
- **Обща дозировка:** 15 mg Амоксицилин на kg телесна маса.
- **Приложение:** Една инжекция с възможност за повторение след 48 часа, ако е необходимо, по преценка на ветеринарния лекар.

4. Карентни срокове (време на изчакване)

Карентните срокове се определят според максималната доза и начина на приложение (обикновено се цитират за IM приложение).

Вид Животно	Месо и вътрешни органи	Мляко
Говеда	18 дни	3 дни (72 часа)
Овце	18 дни	3 дни (72 часа)
Прасета	15 дни	Неприложимо

5. Противопоказания и специални предупреждения

- **Противопоказания:**
 - **Не се прилага** при животни, които са свръхчувствителни (алергични) към пеницилини или цефалоспорини.
 - **Не се прилага** на зайци, морски свинчета, хамстери и джърбили, тъй като може да предизвика фатална колитна ентеротоксемия.

- **Не се прилага** при тежка бъбречна дисфункция, придружена от анурия или олигурия.
- **Взаимодействия:** Да не се комбинира с бактериостатични антибиотици (напр. тетрациклини, макролиди).
- **Приложение:** Преди употреба флаконът трябва да се **разклати добре**, за да се гарантира хомогенността на суспензията.