

Характеристики за продукта **Dozuril 50 mg/ml перорална суспензия** на Dopharma.

Този продукт съдържа активното вещество **Толтразурил**, което е кокцидиостатик (антипротозойно средство).¹

Кратка Характеристика на Продукта: Dozuril 50 mg/ml

1. Идентификация на Продукта

Характеристика	Детайли
Търговско Име	Dozuril 50 mg/ml
Фармацевтична Форма	Перорална суспензия. Суспензия за директно перорално приложение.
Активно Вещество	Толтразурил
Концентрация	50 mg/ml
Производител	Dopharma Research B.V.
Фармакотерапевтична Група	Антипротозойни средства. Средства срещу кокцидиоза – QP51AJ01 (Толтразурил)

2. Видове Животни и Показания за Употреба

Продуктът е предназначен за **прасета (сукалчета), говеда (телета) и агнета.**

Вид Животно	Показания (основни)
Прасета (сукалчета)	Профилактика и лечение на кокцидиоза , причинена от <i>Isospora suis</i> при новородени прасенца в периода преди отбиване.

Вид Животно	Показания (основни)
Говеда (телета)	Профилактика на клинични признаци на кокцидиоза и намаляване на отделянето на кокцидии, причинени от <i>Eimeria bovis</i> и <i>Eimeria zuernii</i> .
Агнета	Профилактика на клинични признаци на кокцидиоза и намаляване на отделянето на кокцидии, причинени от <i>Eimeria crandallis</i> и <i>Eimeria ovinoidalis</i> .

3. Начин на Приложение и Дозировка

- **Начин на приложение:** Еднократно перорално приложение (директно в устата).

Вид Животно	Дозировка	Време на прилагане
Прасета	20 mg Толтразурил на kg телесна маса (еквивалентно на 0,4 ml суспензия на kg).	Еднократно на възраст 3 до 5 дни .
Телета	15 mg Толтразурил на kg телесна маса (еквивалентно на 3,0 ml суспензия на 10 kg).	Еднократно на възраст 5 до 8 седмици (или 2 седмици след преместване).
Агнета	20 mg Толтразурил на kg телесна маса (еквивалентно на 0,4 ml суспензия на kg).	Еднократно на възраст 4 до 6 седмици (или 2 седмици след преместване).

Забележка: Необходимо е да се гарантира, че дозировката е точна, като се използва подходящо дозиращо устройство.

4. Карентни Срокове (Време на Изчакване)

Вид Животно	Месо и Вътрешни органи	Мляко
Прасета	77 дни	Неприложимо
Говеда (телета)	63 дни	Не се разрешава за употреба при животни, произвеждащи мляко за консумация от човека.
Овце (агнета)	42 дни	Не се разрешава за употреба при животни, произвеждащи мляко за консумация от човека.

5. Противопоказания и Специални Предупреждения

- **Противопоказания:**
 - Не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества.
 - Не се използва при животни, предназначени за разплод.
- **Резистентност:** Тъй като рискът от резистентност е висок, употребата трябва да бъде подкрепена от паразитологично изследване, потвърждаващо наличието на кокцидии.
- **Превантивни мерки:** Толтразурилът е ефективен само срещу кокцидиите. Подобряването на хигиената е от съществено значение за предотвратяване на остра кокцидиоза.