

Този продукт е комбинация от две антибактериални вещества:
Сулфаметоксипиридазин и Триметоприм.

Кратка Характеристика на Продукта: TRIMSULFASOL (Концентрат)

1. Идентификация на Продукта

Характеристика	Детайли
Търговско Име	TRIMSULFASOL (Концентрат за перорален разтвор)
Фармацевтична Форма	Концентрат за разтвор за приложение в питейна вода/мляко
Активни Вещества	1. Сулфаметоксипиридазин (Sulfamethoxypyridazine)
	2. Триметоприм (Trimethoprim)
Концентрация	Сулфаметоксипиридазин: 80 mg/ml + Триметоприм: 20 mg/ml
Съотношение	4:1 (Сулфаметоксипиридазин към Триметоприм)
Производител	Dopharma Research B.V.
Фармакотерапевтична Група	Антибактериални средства. Сулфонамиди и триметоприм – QJ01EW08

2. Видове Животни и Показания за Употреба

Продуктът е предназначен за **прасета, пилета и пуйки.**

Използва се за лечение на инфекции, причинени от бактерии, чувствителни към комбинацията Сулфаметоксипиридазин/Триметоприм (котримоксазол).

Вид Животно	Показания (основни)
Прасета	Лечение на бактериални респираторни и храносмилателни инфекции , като пневмонии, бронхити, колибацилоза и други инфекции, причинени от чувствителни щамове на <i>E. coli</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Pasteurella</i> , и др.
Пилета и Пуйки	Лечение на бактериални респираторни и храносмилателни инфекции , включително колибацилоза, пастъорелоза (холера по птиците) и други заболявания, причинени от чувствителни микроорганизми.

3. Начин на Приложение и Дозировка

- **Начин на приложение:** Перорално, разтворен в питейната вода.
- **Дозировката** се изчислява въз основа на телесното тегло на животните и средната дневна консумация на вода.

Вид Животно	Обща Доза (Комбинация)	Продължителност на лечението
Прасета	10-15 mg активни вещества на kg телесна маса дневно.	Обикновено 3 до 5 дни.
Пилета и Пуйки	10-15 mg активни вещества на kg телесна маса дневно.	Обикновено 3 до 5 дни.

4. Карентни Срокове (Време на Изчакване)

Тъй като това е общо описание, карентните срокове могат да варират леко според конкретната национална регистрация, но обикновено са:

Вид Животно	Месо и вътрешни органи	Яйца
Прасета	8 до 10 дни (примерно)	Неприложимо
Пилета	5 до 8 дни (примерно)	Не се разрешава за употреба при птици, които снасят яйца за консумация от човека.
Пуйки	10 до 12 дни (примерно)	Не се разрешава за употреба при птици, които снасят яйца за консумация от човека.

5. Противопоказания и Специални Предупреждения

- **Противопоказания:**

- Свръхчувствителност към сулфонамиди или триметоприм.
- Животни с тежки чернодробни или бъбречни увреждания.
- Нарушения в кръвотворната система (като анемия, левкопения).

- **Специални предупреждения:**

- Сулфонамидите могат да предизвикат кристалурия (образуване на кристали в урината), особено при дехидратирани животни. Трябва да се осигури адекватен прием на вода.
- Продължителната употреба на сулфонамиди може да доведе до потискане на функцията на щитовидната жлеза.
- Приготвеният разтвор трябва да бъде единственият източник на питейна вода за животните по време на лечението.