



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного висновку від 15.02.2018 № 384-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 28.02.2018 р. № 179 зареєстровано:

препарат

Мультимаст ДС

форма

Суспензія для інтрацестернального застосування

Власник реєстраційного посвідчення:

*Бімеда Кемікалс Експорт, (Підрозділ Кросс Ветфарм Груп Лтд.)
Брумхіл Роуд, Талагт, Дублін 24, Ірландія*

зареєстровано в Україні за №

АА-03690-01-12

від

28.02.2018

Виробник:

*Бімеда Кемікалс Експорт, (Підрозділ Кросс Ветфарм Груп Лтд.)
Брумхіл Роуд, Талагт, Дублін 24, Ірландія
Юнівет Лтд.
Туллівін, Кутегілл, Ко. Каван, Ірландія*

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2)
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до

27.02.2023

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату



Коротка характеристика препарату

1. Назва

Мультимаст ДС

2. Склад

1 шприц-туба (4,5 г) містить діючі речовини:

неоміцину сульфат	- 100 мг,
пенетамат гідройодид	- 100 мг,
прокаїну бензилпеніцилін	- 400 мг.

Допоміжні речовини: стеарат алюмінію, рідкий парафін.

3. Фармацевтична форма

Суспензія для інтрацистернального застосування.

4. Фармакологічні властивості

АТС –vet класифікаційний код: QJ5IRC23 – антибактерійні ветеринарні препарати для інтрацистернального застосування. Прокаїну бензилпеніцилін у комбінації з іншими протимікробними препаратами.

Мультимаст ДС це комбінований протимаститний препарат, до складу якого входять неоміцину сульфат, пенетамат гідройодид та прокаїну бензилпеніцилін.

Прокаїн бензилпеніцилін є бактерицидним антибіотиком пеніцилінового ряду, що діє на грампозитивні та грамнегативні бактерії: *Campylobacter spp.*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Pasteurella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* Механізм дії його полягає у порушенні синтезу пептидоглікану - мукопептиду клітинної оболонки, що призводить до інгібування синтезу клітинної стінки мікроорганізму, гальмування росту і розмноження бактерій.

Неоміцин – аміноглікозидний антибіотик широкого спектру дії. Механізм дії неоміцину полягає у гальмуванні синтезу білка в мікробній клітині. Неоміцин активний проти грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів: *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*.

Пенетамат гідройодид – це складний ефір бензилпеніциліну, який гідролізується при рН 7,3 з виділенням вільного пеніциліну. Тому він має механізм дії та спектр активності бензилпеніциліну.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Корови.

5.2 Показання до застосування

Лікування корів в період сухостою при інтрацистернальних інфекціях та профілактика маститів в період сухостою.

5.3 Протипоказання

Не застосовувати тваринам в період лактації.

Не застосовувати пізніше, ніж за 50 діб до отелу.

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до будь-якого з активnodіючих компонентів препарату.

5.4 Побічна дія

Іноді при використанні можливе виникнення алергічних реакцій у тварин з підвищеною індивідуальною чутливістю до діючих компонентів препарату.

5.5 Особливі застереження при використанні

Немає.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Препарат не рекомендується застосовувати протягом 50 діб перед отелом, а також в період лактації.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не відома.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Після останнього видоювання вміст однієї шприц-туби вводять в кожну чверть молочної залози, яку попередньо видоюють і дезінфікують. Після введення препарату чверть молочної залози масажують для рівномірного розподілу його по всій цистерні. Слід уникати забруднення наконечника шприца.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Не виявлене.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.

5.11 Період виведення (каренції)

Молоко для споживання в їжу людям можна використовувати через 96 годин після отелення у корів з періодом сухостою більше 50 днів.

Якщо отелення відбулось через 50 днів після останнього лікування, молоко для споживання в їжу людям може бути використане через 50 днів + 96 годин після останнього введення препарату.

Забораються забій тварин на м'ясо під час лікування. Споживання м'яса в їжу дозволяється через 28 днів після останнього введення препарату.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Пеніциліни та цефалоспорины можуть спричинити гіперчутливість (алергію) після введення, інгаляції, використання чи контакту зі шкірою. Гіперчутливість до пеніцилінів може призводити до виникнення перехресних реакцій з цефалоспорином та навпаки. Алергічні реакції на ці речовини можуть бути серйозними.

Якщо з'явилися симптоми алергії (висипання на шкірі) зверніться за консультацією до лікаря. Свербіж обличчя, очей чи губ, важке дихання є більш серйозними симптомами і потребують негайної медичної допомоги.

Після роботи з препаратом необхідно помити руки.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Не відомі.

6.2 Термін придатності

2 роки.

6.3 Особливі заходи зберігання

Суше, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 2°C до 25°C.

6.4 Природа і склад контейнера первинного упакування

Поліетиленове відро, яке містить 120 поліетиленових шприц-тубів по 4,5 г.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат та контейнери повинні утилізуватися відповідно до місцевих вимог згідно з законом.

7. Назва та адреса власника реєстраційного посвідчення

Бімеда Кемікалс Експорт (Підрозділ Кросс Ветфарм Груп Лтд.) Брумхіл Роуд, Талагт, Дублін 24 Ірландія	Bimeda Chemicals Export (A division of Cross Vetpharm Group Ltd.) Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24 Ireland
---	--

8. Назва та адреса виробника готового продукту

Бімеда Кемікалс Експорт (Підрозділ Кросс Ветфарм Груп Лтд.) Брумхіл Роуд, Талагт, Дублін 24 Ірландія	Bimeda Chemicals Export (A division of Cross Vetpharm Group Ltd.) Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24 Ireland
---	--

Юнівет Лтд. Туллівін, Кутегілл, Ко.Каван Ірландія	Univet Ltd. Tuiiyvin, Cootehill, Co. Cavan Ireland
---	--

Мультимаст ДС
(суспензія для інтрацестерального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Суспензія білого кольору зі специфічним запахом.

Склад

1 шприц-туба (4,5 г) містить діючі речовини:

неоміцину сульфат	- 100 мг,
пенетамат гідродид	- 100 мг,
прокаїну бензилпеніцилін	- 400 мг.

Допоміжні речовини: стеарат алюмінію, рідкий парафін.

Фармакологічні властивості

АТС –vet класифікаційний код: QJ5IRC23 – антибактерійні ветеринарні препарати для інтрацестерального застосування. Прокаїну бензилпеніцилін у комбінації з іншими протимікробними препаратами.

Мультимаст ДС - це комбінований протимаститний препарат, до складу якого входять неоміцину сульфат, пенетамат гідродид та прокаїну бензилпеніцилін.

Прокаїн бензилпеніцилін є бактерицидним антибіотиком пеніцилінового ряду, що діє на грампозитивні та грамнегативні бактерії: *Campylobacter spp.*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Pasteurella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* Механізм дії його полягає у порушенні синтезу пептидоглікану - мукопептиду клітинної оболонки, що призводить до інгібування синтезу клітинної стінки мікроорганізму, гальмування росту і розмноження бактерій.

Неоміцин – аміноглікозидний антибіотик широкого спектру дії. Механізм дії неоміцину полягає у гальмуванні синтезу білка в мікробній клітині. Неоміцин активний проти грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів: *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*.

Пенетамат гідродид – це складний ефір бензилпеніциліну, який гідролізується при рН 7,3 з виділенням вільного пеніциліну. Тому він має механізм дії та спектр активності бензилпеніциліну.

Застосування

Лікування корів в період сухостою при інтрацестеральних інфекціях та профілактика маститів в період сухостою.

Дозування

Після останнього видоювання вміст однієї шприц-туби вводять в кожну чверть молочної залози, яку попередньо видоюють і дезінфікують. Після введення препарату чверть молочної залози масажують для рівномірного розподілу його по всій цистерні. Слід уникати забруднення наконечника шприца.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам в період лактації.

Не застосовувати пізніше, ніж за 50 діб до отелу.

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до будь-якого з активніючих компонентів препарату.

Застереження

Молоко для споживання в їжу людям можна використовувати через 96 годин після отелення у корів з періодом сухостою більше 50 діб.

Якщо отелення відбулось через 50 діб після останнього лікування, молоко для споживання в їжу людям може бути використане через 50 діб + 96 годин після останнього введення препарату.

Забораються забій тварин на м'ясо під час лікування. Споживання м'яса в їжу дозволяється через 28 діб після останнього введення препарату.

Форма випуску

Поліетиленове відро, яке містить 120 поліетиленових шприц-тубів по 4,5 г.

Зберігання

28.02.2018

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 2°C до 25°C.
Термін придатності – 2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Назва та адреса власника реєстраційного посвідчення

Бімеда Кемікалс Експорт (Підрозділ Кросс Ветфарм Груп Лтд.) Брумхіл Роуд, Талагт, Дублін 24, Ірландія	Bimeda Chemicals Export (A division of Cross Vetpharm Group Ltd.) Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, Ireland
--	---

Назва та адреса виробника готового продукту

Бімеда Кемікалс Експорт (Підрозділ Кросс Ветфарм Груп Лтд.) Брумхіл Роуд, Талагт, Дублін 24 Ірландія	Bimeda Chemicals Export (A division of Cross Vetpharm Group Ltd.) Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, Ireland
---	---

Юнівет Лтд. Туллівін, Кутегілл, Ко.Каван Ірландія	Univet Ltd. Tuiiyvin, Cootehill, Co. Cavan Ireland
---	--

28.02.2018

Мультимаст ДС

Суспензія для інтрацистернального застосування

СКЛАД: 1 шприц (4,5г) містить неоміцину сульфат – 100,00 мг, пенетамату гідройодид – 100 мг, прокаїну бензилпеніцилін – 400 мг. Допоміжні речовини: стеарат алюмінію, рідкий парафін.

Лікування корів в період сухостою при інтрамамарних інфекціях та профілактика маститів в період сухостою.

Період виведення:

Молоко – 50 діб+96 годин

М'ясо – 28 діб

Інша інформація: Читайте листівку-вкладку перед застосуванням.

VPA Number: 10959/8/1



ТІЛЬКИ ДЛЯ РАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!

Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 2°C до 25°C

Власник реєстраційного посвідчення:

Бімеда Кемікалс Експорт, (Підрозділ Кросс Ветфарм Груп Лтд.), Брумхіл Роуд, Талагт, Дублін 24, Ірландія

Виробник: Бімеда Кемікалс Експорт, (Підрозділ Кросс Ветфарм Груп Лтд.), Брумхіл Роуд, Талагт, Дублін 24, Ірландія

Юнівет Лтд, Туллівін, Кутегілл, Ко.Каван, Ірландія
РП №:

Серія №:

Придатний до:

