

Cýmedica

Epityl®

s obsahem 60 mg
fenobarbitalu

Informace
pro majitele

Převzetí kontroly
nad epilepsií



DĚLITELNÁ TABLETA

Umožňuje přesné dávkování



SNADNÉ PODÁNÍ

Díky příchuti grilovaného masa



VÝHODNÉ BALENÍ

K dostání v balení 10 x 10 tablet



**OCHUCENÉ TABLETY
S FENOBARBITALEM
PRO PSY**

Tato brožura vám pomůže lépe porozumět epilepsii vašeho psa a vysvětlí, jak může přípravek Epityl® pomoci.



Co je epilepsie?

Epilepsie je běžné neurologické onemocnění psů, které se projevuje opakovaným výskytem záchvatů. Odhaduje se, že jim trpí 0,6 – 0,75% z celkové populace psů. Pokud je tedy v České republice odhadem okolo 2 500 000 psů, tak epilepsií bude trpět 15 000 – 18 750 psů.^{1,2} Příčiny epilepsie mohou být různé a veterinář se snaží určit, zda je přítomna konkrétní příčina. Pokud žádná příčina není identifikována, stanovuje se diagnóza **primární (idiopatické) epilepsie**.

Jaké existují typy epilepsie?

Rozlišujeme několik typů epilepsie v závislosti na její základní příčině:

- **Primární (idiopatická) epilepsie** je diagnostikována, pokud nelze identifikovat žádnou základní příčinu. Zahrnuje také geneticky podmíněné případy a nejčastěji je diagnostikována u psů mladších šesti let.³
- **Strukturální epilepsie** je diagnostikována, pokud jsou v mozku zjištěny abnormality, obvykle pomocí MRI nebo analýzy mozkomíšního moku. Tyto změny mohou zahrnovat například cévní problémy, záněty, infekce, traumatické léze, vývojové nebo degenerativní změny a nádory mozku. Tento typ epilepsie je častěji diagnostikován u psů starších šesti let.³
- **Reaktivní záchvaty** jsou vyvolány metabolickými poruchami nebo expozicí toxickými látkami. Po odstranění základní příčiny obvykle ustupují.

A close-up photograph of a dog's head, showing its large, floppy ear and part of its face, set against a dark blue background.

Co dělat, když má váš pes záchvat?

Většina záchvatů není život ohrožující. Pokud si myslíte, že má váš pes záchvat, nepanikařte a kontaktujte svého veterináře. Ujistěte se, že prostor, ve kterém se nacházíte, je pro psa bezpečný (odstraňte nábytek z cesty a pokud možno ztlumte světla). Pes si během záchvatu nepolkne jazyk, proto se nepokoušejte sahat mu do tlamy. Abyste pomohli vašemu veterináři určit typ záchvatu, zkuste zaznamenat délku trvání nebo natočte průběh záchvatu na mobil.

Pokud váš pes nemá prodloužený záchvat ani sérii záchvatů po sobě, počkejte, až záchvat skončí, než se pokusíte vzít psa k veterináři. Je důležité si uvědomit, že chování vašeho psa se během záchvatu a po něm může změnit, proto buďte při manipulaci opatrní.

Pokud váš pes zažívá shluky záchvatů (více než jeden záchvat během 24 hodin) nebo status epilepticus (kontinuální záchvat trvající déle než pět minut, nebo několik krátkých záchvatů bez úplného zotavení mezi nimi), může jít o život ohrožující stav a je nutné kontaktovat veterinární pohotovost.




Je pro mého psa záchvat bolestivý nebo nebezpečný?

Většina záchvatů je krátká a váš pes si jich pravděpodobně nebude vědom. Pokud se objeví jen jeden krátký záchvat, je nepravděpodobné, že by způsobil jakékoli poškození.

Pokud váš pes zažívá shluky záchvatů (více než jeden záchvat během 24 hodin) nebo status epilepticus (kontinuální záchvat trvající déle než pět minut, nebo několik krátkých záchvatů bez úplného zotavení mezi nimi), může jít o život ohrožující stav, kdy se například zvyšuje tělesná teplota psa (až nad 40 °C) a je vždy nutné kontaktovat veterinární pohotovost.

Co je přípravek Epityl?

Účinnou látkou přípravku Epityl je fenobarbital, což je antiepileptikum používané jak v lidské, tak ve veterinární medicíně. Terénní studie prokázaly jeho vysokou účinnost při kontrole záchvatů a doporučují ho jako vhodnou první volbu pro monoterapii epilepsie psů.⁴



Jak se podává Epityl®?



Epityl® je ochucená tableta, která se psovi podává do tlamy dvakrát denně.

Váš pes musí dostávat lék ve stejnou dobu každý den, ideálně koordinovaně s časy krmení a vždy stejným způsobem.

Váš veterinář vypočítá, kolik tablet váš pes potřebuje. **Tablety lze v případě potřeby dělit až na čtvrtiny následujícím způsobem:**

Chcete-li tabletu **rozdělit na poloviny**, položte ji na rovný povrch rýhou nahoru, držte jednu polovinu a stlačte druhou.

Je důležité neměnit interval ani dávku přípravku Epityl®, pokud to veterinář výslovně nedoporučí.

Jak dlouho trvá, než začne přípravek účinkovat?

Plný účinek přípravku se projeví až za 2 týdny. Váš veterinář odebere krevní vzorek 1 – 2 týdny po zahájení podávání Epitylu®, aby zkontroloval, zda je dávka správná.

Co je důležité sledovat, pokud má váš pes epilepsii?



Pokud byla u vašeho psa stanovena diagnóza „epilepsie“, je potřeba vést si deník záchvatů, do kterého zapisujete datum, čas a délku každého záchvatu. Užitečné je také zaznamenat změny chování před a po záchvatu, stejně jako možné spouštěče, které mohly záchvat vyvolat.

Pokud váš pes užívá jakékoli léky, je vhodné zaznamenávat čas jejich podání a případné vedlejší účinky, které se u psa mohou objevit.

MEZI MOŽNÉ VIDITELNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY PATŘÍ:

- útlum,
- zvýšené močení,
- zvýšená žízeň,
- zvýšená chuť k jídlu,
- přibývání na váze,
- neobratnost,
- přehnaná podrážděnost či hyperaktivita.

Fenobarbital může být spojen s poškozením jater u psů, ale při správném dávkování je to vzácné. Váš veterinář bude sledovat funkci jater odběrem krevního vzorku každých 6–12 měsíců.



Jak často mám podávat Epityl®?

Epityl® se podává dvakrát denně. Váš pes bude vyžadovat doživotní léčbu, protože idiopatická epilepsie není léčitelná. Náhlé přerušení podávání antiepileptik může být velmi nebezpečné, proto si vždy zajistěte dostatečnou zásobu léku. Už jedno nepodání dávky může vyvolat epileptický záchvat. Dávku ani interval podávání léku neměňte bez doporučení veterináře.

Co dělat, pokud zapomenete podat dávku?

Snažte se dávky nevynechávat, protože nesprávné časování může snížit účinnost léčby. Pokud dávku zapomenete podat, dejte ji hned, jakmile si vzpomenete. Pokud je však čas velmi blízko další plánované dávky, vynechte zapomenutou dávku a pokračujte podle běžného léčebného schématu.

Co dělat, pokud váš pes omylem přijme příliš mnoho tablet?

Léky uchovávejte vždy mimo dosah zvířat a dětí. Pokud pes sní příliš mnoho tablet, snažte se zjistit, kolik tablet a v kolik hodin je pes snědl, a ihned kontaktujte veterináře.

Jak často bych měl chodit se svým psem na kontrolu k veterináři?

Po zahájení léčby veterinář odebere krevní vzorek 1 – 2 týdny po začátku podávání léku, aby zkontroloval, zda je dávka správná. Pokud bude potřeba dávku upravit, odebere se další vzorek 1 – 2 týdny po změně dávky. Jakmile je stanovena správná dávka, pes bude potřebovat kontrolu a krevní test každých 3 – 6 měsíců, aby se ověřilo, že dávka zůstává vhodná, a aby se sledovaly případné nežádoucí účinky.

Pokud váš pes prodělá záchvat, kontaktujte svého veterináře. Pokud se četnost záchvatů zvýší, veterinář může chtít provést další krevní test. Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky léku nebo máte jiné obavy, obraťte se na svého veterináře pro radu.



Deník záchvatů

Datum:

Nálady a možné spouštěče záchvatu:

.....

Datum:

Nálady a možné spouštěče záchvatu:

.....

Datum:

Nálady a možné spouštěče záchvatu:

.....

Deník záchvatů

Datum:

Nálady a možné spouštěče záchvatu:

Datum:

Nálady a možné spouštěče záchvatu:

Datum:

Nálady a možné spouštěče záchvatu:

Deník záchvatů

Datum:

Nálady a možné spouštěče záchvatu:

.....

Datum:

Nálady a možné spouštěče záchvatu:

.....

Datum:

Nálady a možné spouštěče záchvatu:

.....

Přípravek Epityl® 60 mg pro psy. Každá tableta obsahuje 60 mg fenobarbitalu. Kompletní informace o indikacích, vedlejších účincích, opatřeních, varováních, kontraindikacích a ochranné lhůtě naleznete na obalu přípravku a v příbalovém letáku.

Další informace jsou k dispozici v souhrnu údajů o přípravku (SPC) nebo na www.cymedica.cz. Přípravek je k dostání pouze na veterinární předpis a podle české legislativy je zařazen mezi omamné a psychotropní přípravky.



Reference:

1. PFMA Pet population 2018 - <https://www.pfma.org.uk/pet-population-2018>
2. Kearsley-Fleet L, O'Neill DG, Volk HA, Church DB, Brodbelt DC: Prevalence and risk factors for canine epilepsy of unknown origin in the UK. Vet Rec 2013, 172(13):338.
3. Volk H, Clinical Forum: how to manage canine epilepsy successfully?, Companion Animal July 2015, Volume 20 No 7
4. Podell M, Volk HA, Berendt M, et al. 2015 ACVIM Small Animal Consensus Statement on Seizure Management in Dogs. J Vet Intern Med 2016;30:477-490.
5. Charalambous M, et al., Treatment in canine epilepsy – a systematic review. BMC Veterinary Research 2014, 10:257
6. Charalambous M, et al., Antiepileptic drugs' tolerability and safety – a systematic review and meta-analysis of adverse effects in dogs. BMC Veterinary Research (2016) 12:79
7. Chandler K, Treatment and monitoring of epilepsy in dogs. In Practice March 2011, Volume 33, 98-104
8. Stabile F, et al., Treating idiopathic epilepsy in cats and dogs – part one, Vet Times 2011

