

Liečba obštrukčného srdcového zlyhania (CHF) a dilatačnej kardiomyopatie (DCM) pri psoch

4 RÔZNE SILY

DELITEĽNÉ TABLETY

1,25 mg

2,5 mg



CARDISURE®

(pimobendan)

5 mg

10 mg

OCHUTENÉ TABLETY

BALENIE V BLISTROCH


Dechra
Veterinary Products

Cymedica

Cymedica SK, s.r.o. | Družstevná 1415/8 | SK 960 01 Zvolen | tel.: +421455400040 | e-mail: info@cymedica.sk | www.cymedica.com

DVOJAKÝ ÚČINOK Cardisure®:

1. Pozitívne inotropný účinok

vyššia senzitivita myokardu na vápnik (vrátane inhibície fosfodiesterázy III) = lepšia kontraktilita a zvýšený výdaj krvi zo srdca (bez vyšších požiadaviek na kyslík)

2. Vazodilatačný účinok

efektívnejšie zásobenie myokardu rozšírením koronárnych ciev (inhibícia fosfodiesterázy III) + zvýšenie prietoku obličkami (inhibícia angiotenzínu II)

Cardisure

Pimobendan



Odporúčané dávkovanie:

0,25 mg/kg ž.hm. 2x denne
(0,2 mg – 0,6 mg/ kg ž.hm. a deň)
podanie min. hodinu pred kŕmením