

Výživa hraje zásadní roli při zvládnání neočekávané ztráty hmotnosti

Pokud kočka nepřijímá dostatek potravy, chybí jí základní živiny a energie a to má negativní vliv na její zdraví.

Než veterinář zjistí základní příčinu hubnutí, je důležité, aby Vaše kočka dostala potřebné živiny.

Pro takové případy je určeno speciální komplexní krmivo SPECIFIC® F/C-IN-W Intensive Support, které zajistí potřebnou energii a živiny, napomůže rekonvalescenci kočky a zabrání vzniku nebezpečné jaterní lipidózy.

Výhody SPECIFIC® Intensive Support:

- Vysoká hladina energie, tuků a bílkovin zajistí dostatek živin i při snížené chuti k jídlu;
- Vysoce stravitelné přísady kompenzují horší trávení a tyto složky také podpoří imunitu: beta-glukany, vysoká hladina rybího oleje, zinek, selen, arginin;
- L-karnitin, tzv. spalovač tuků, pomáhá přeměnit tuk na energii;
- Specific® Intensive Support je aktuálně dostupný jako paštika (7*95 g), NOVĚ (jaro/léto 2021) také jako tekutá forma (400 g). Paštika má speciální měkkou strukturu a po rozředění je vhodná i pro aplikaci sondou.



SPECIFIC F/C-IN-W Intensive Support

Dlouhodobá podpora výživy

Jakmile veterinář stanoví diagnózu, je potřeba řešit i dlouhodobou výživu tak, aby odpovídala zjištěnému onemocnění a zůstala zachována chuť Vaší kočky a její hmotnost. Dobrá zpráva je, že diety SPECIFIC® nabízejí širokou škálu speciálních diet, které výše zmíněné potřeby zajistí.



Více informací o nabídce speciální výživy naleznete na www.specifictdiet.cz.

Tabulka pro evidenci léčby majitelem

Mirataz® se aplikuje 1x denně vždy na vnitřní stranu jednoho ucha kočky – je potřeba střídát pravé a levé ucho a tuto informaci zapsat do tabulky.

Je vhodné také zaznamenat chuť k jídlu a to vyplněním hvězdiček: 1 hvězdička = žádná chuť k jídlu, 5 hvězdiček = normální chuť k jídlu.

1. týden	Pravé ucho	Levé ucho	Chuť k jídlu				
Pondělí	☒	☐	★	★	★	★	★
Úterý	☐	☐	★	★	★	★	★
Středa	☐	☐	★	★	★	★	★
Čtvrtek	☐	☐	★	★	★	★	★
Pátek	☐	☐	★	★	★	★	★
Sobota	☐	☐	★	★	★	★	★
Neděle	☐	☐	★	★	★	★	★

2. týden	Pravé ucho	Levé ucho	Chuť k jídlu				
Pondělí	☒	☐	★	★	★	★	★
Úterý	☐	☐	★	★	★	★	★
Středa	☐	☐	★	★	★	★	★
Čtvrtek	☐	☐	★	★	★	★	★
Pátek	☐	☐	★	★	★	★	★
Sobota	☐	☐	★	★	★	★	★
Neděle	☐	☐	★	★	★	★	★

Razítko veterinárního pracoviště

Společnost Cymedica je výhradním dovozcem přípravku Mirataz® do České republiky a na Slovensko.

Cymedica


Pod Nádražím 308 | CZ 268 01 Hořovice | tel.: +420 311 706 211
e-mail: info@cymedica.cz | www.cymedica.com



Hubne Vaše kočka?

Úbytek hmotnosti může být nejčasnějším indikátorem onemocnění u koček.

Proto navštivte veterináře a zeptejte se ho také na přípravek Mirataz®.



Mirataz®

Převezměte kontrolu nad hubnutím s přípravkem Mirataz®



Právě Vy v domácím prostředí můžete zachytit první příznaky hubnutí.

Při denním kontaktu s Vaším kočičím mazlíčkem si všimnete jakýchkoli změn v jejich chování a stavbě těla.

Velmi důležité jsou změny ve stravovacích návycích, včetně:


- Zájmu o jídlo;
- Celkově přijatého množství potravy;
- Času, za jak dlouho kočka denní dávku přijme.

Při mazlení s kočkou zkontrolujte:

- Zda její žebra nejsou více hmatná;
- Zda je stále stejně osvalená nad kostními výběžky;
- Zda se nezhoršila kvalita její srsti.

Důležitý je jak příjem potravy, tak aktuální váha Vaší kočky.

Při jakýchkoli změnách je potřeba neprodleně kontaktovat veterináře a tyto změny s ním probrat.



Pokud zjistíte, že Vaše kočka ztrácí váhu, okamžitě kontaktujte veterináře.

Co je Mirataz®?


Mirataz® je první registrovaný veterinární lék pro léčbu hubnutí u koček s chronickým onemocněním.

Jelikož Vaše kočka neočekávaně hubne, je potřeba zjistit příčinu této ztráty hmotnosti a to vyžaduje nějaký čas. Mirataz® krátkodobě pomůže Vaší kočce přibrat na váze. Mirtazapin, účinná látka přípravku Mirataz®, řeší sníženou chuť k jídlu. Úprava váhy by měla být zřetelná v průběhu 14 dní.




Při aplikaci přípravku Mirataz® je nutné:

- Vždy nosit nepropustné rukavice;
- Po každé aplikaci použité rukavice zlikvidovat a umýt si ruce;
- Otevřenou tubu vždy uložit zpět do plata a krabičky a chránit ji před dětmi;
- Po dobu 14 dní 1x denně aplikovat 3,8 cm přípravku na vnitřní stranu jednoho ucha a uši denně střídát;
- Po aplikaci je třeba 12 hodin zamezit kontaktu s ošetřeným zvířetem (lidem i ostatním zvířatům), protože mirtazapin může být absorbován orálně i přes pokožku;
- Pokud přípravek aplikujete večer, tak by ošetřené kočky neměly spát s majiteli. Je také možné aplikovat přípravek ráno před odchodem do práce;
- Pokud dávku zapomenete podat, podejte ji následující den;
- Příjem potravy se může po vysazení přípravku Mirataz snížit a měl by být sledován. Pokud to trvá déle než 48 hodin, je potřeba kontaktovat veterináře.



Mirataz® je kožní mast, která se aplikuje na vnitřní stranu ucha kočky.



Krok 1:
Nasadte si nepropustné rukavice.

Krok 2:
Otočením víčka na tubě proti směru hodinových ručiček je otevřete.

Krok 3:
Rovnoměrně zatlačte na tubu a pomocí vyznačené linky na krabičce vytlačte na ukazováček 3,8 cm masti.

Krok 4:
Prstem jemně vetřete mast na vnitřní povrch ucha kočky a rovnoměrně ji rozetřete.
Dojde-li ke kontaktu s pokožkou, důkladně ji omyjte vodou a mýdlem.

Fialová linka výše má stejnou délku jako je délka masti, která se má aplikovat (3,8 cm):



Více informací o produktu a videa naleznete na www.cymedica.com – Vzdělávání – Odborné materiály – Mirataz nebo po načtení QR kódu.



Pokud si během léčby přípravkem Mirataz® nebudete ničím jisti, kontaktujte veterináře.