





Pokud kočka neočekávaně ztrácí hmotnost,
je potřeba něco udělat hned

Nový přípravek Mirataz® pomáhá kočkám přibrat

- Transdermální mast s účinnou látkou mirtazapin
- Aplikace 1x denně na vnitřní stranu boltce ucha po dobu 14 dní



Více informací o produktu a jeho správné aplikaci
naleznete na www.cymedica.com v sekci Vzdělávání -
Odborné materiály - Mirataz nebo po načtení QR kódu.


Co je Mirataz®?

Mirataz® je první registrovaný veterinární lék pro léčbu hubnutí u koček s chronickým onemocněním.


Mirataz® krátkodobě pomůže kočce přibrat na váze. Mirtazapin, účinná látka přípravku Mirataz®, řeší sníženou chuť k jídlu. Úprava váhy by měla být zřetelná v průběhu 14 dní.

Při aplikaci přípravku Mirataz® je nutné:

- ▶ Vždy nosit nepropustné rukavice;
- ▶ Po každé aplikaci použité rukavice zlikvidovat a umýt si ruce;
- ▶ Otevřenou tubu vždy uložit zpět do plata a krabičky a chránit ji před dětmi;
- ▶ Po dobu 14 dní 1x denně aplikovat 3,8 cm přípravku na vnitřní stranu jednoho ucha a uši denně střídát;
- ▶ Po aplikaci je třeba 12 hodin zamezit kontaktu s ošetřeným zvířetem;
- ▶ Pokud je přípravek aplikován večer, tak by ošetřené kočky neměly spát s majiteli. Je také možné aplikovat přípravek ráno před odchodem do práce;
- ▶ Příjem potravy se může po vysazení přípravku Mirataz® snížit a měl by být sledován.




Mirataz® je kožní mast, která se aplikuje na vnitřní stranu ucha kočky.




Krok 1:

Nasadte si nepropustné rukavice.




Krok 2:

Otočením víčka na tubě proti směru hodinových ručiček jej otevřete.



Krok 3:

Rovnoměrně zatlačte na tubu a pomocí vyznačené linky na krabičce vytlačte na ukazováček 3,8 cm masti.



Krok 4:

Prstem jemně vetřete mast na vnitřní povrch ucha kočky a rovnoměrně ji rozetřete. Dojde-li ke kontaktu s pokožkou, důkladně ji omyjte vodou a mýdlem.

Fialová linka výše má stejnou délku jako je délka masti, která se má aplikovat (3,8 cm).